

L A S

DROGAS

MATAN ⊕ ENFERMAN



CARBONA

♡

PILDORAS

MARIHUANA

PEGA

Preparado por:

PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE
SECCIÓN DE TRABAJO SOCIAL
NEWARK, NUEVA JERSEY

LAS DROGAS MATAN O ENFERMAN
"Despierta Amigo"

<u>CLASE DE DROGA</u>	<u>SINTOMAS FISICOS Y MENTALES</u>	<u>SEÑALES E INDICIOS DE USO DE LA DROGA</u>	<u>PELIGROS Y DAÑOS CAUSADOS POR LA DROGA</u>
Pega, carbón "cola" "ziner". Productos para sacar manchas. Gasolina y otros productos similares.	Apariencia borracha o soñolienta. A veces es violento y agresivo. Ojos aguados y agua por la nariz. Le pica la nariz y la cara. Tiene los ojos rojos. Siente sonidos en los oídos.	Tiene bolsas de papel y plásticas. Pañuelos con olores raros. Usa tubitos, latas y botellas de pega. Tiene manchas de pega en la ropa y en las manos. Tiene pots de aerosol o "spray".	Puede morir por asfixia o puede ahogarse con los vapores de la pega "thinner", "cola" o "carbón". El cerebro, los pulmones y el hígado son dañados. Puede producir anemia y daños mentales.
Heroína, morfina y cocaina. Conocidos por "la estufa", la "cura", "nieve", la "H", "dope", "herse" y otros.	Aturdido y mareado, marcas de agujas en los brazos, piernas, y otras partes del cuerpo. Poco apetito, ojos aguados. Agua por la nariz. Manchas de sangre en la ropa. Cuando necesita el "fix" (la droga) tiembla y/o vomita.	Tiene agujas, goteros, algodón, torniquetes, chapas de botellas y cucharas quemadas, sobres plásticos o de papel encerado. Sobres con polvo blanco o marrón claro. La heroína no tiene olor, pero tiene un sabor amargo.	Puede morir de una sobredosis. Puede volverse loco, se destruye al cerebro y el hígado. Puede contraer hepatitis y/o morir de aire en las venas.
Jarabes y medicinas para la tos y catarrros, y medicinas para dolores que contengan codeína.	Aparece estar borracho, poca coordinación y control del cuerpo y de las manos. Confundido y desorientado. Le pica la nariz, la cara y el cuerpo.	Busque por botellas y frascos de jarabes o píldoras vacíos. Tiene polvos blancos con sabores amargos.	Causa que la persona se convierta en adicto a las drogas. Esta droga también es peligrosa y produce problemas de respiración si se usa frecuentemente.
Marihuana. Conocida por "yerba", "pitillo", "pichon", "refil", "jash", "pot", "grasa" y otros.	Aparece estar dormido o soñoliento. No concentra en las cosas y no está alerta. Las pupilas se engrandecen. Tiene mucho apetito y come muchas cosas dulces.	Tiene los dedos amarillentos, papel de cigarrillos y cigarrillos diferentes. Olor fuerte a soga quemada. Pequeñas semillas en los bolsillos. Tiene pipas de fumar.	Le induce a probar narcóticos mas fuertes. También se ha encontrado que el mucho uso causa lesiones al cerebro.
Acidos, LSD, DMT y STP. Conocidos por "cubitos", "azúcar" y otros.	Tiene visiones, se ve alejado de la realidad, su hablar casi no se entiende, las manos y los pies fríos, vomita, llora y se ríe sin razón.	Cubitos de azúcar con color en el centro. La persona tiene olor malo en el cuerpo. Usa tubitos pequeños.	Trata de suicidarse, su comportamiento es difícil de explicar. Mucho uso causa daño al cerebro. LSD causa daño a las cromosomas.

<u>CLASE DE DROGA</u>	<u>SÍNTOMAS FÍSICOS Y MENTALES</u>	<u>SEÑALES E INDICIOS DE USO DE LA DROGA</u>	<u>PELIGROS Y DAÑOS CAUSADOS POR LA DROGA</u>
Amfetaminas, Drogas Estimulantes (píldoras y pastillas, Dexedrine, Synatan, Methedrine y Benzedrine). Conocidas por "despertadoras" "copilotos" "pep pills" y "ups"	Discute mucho y es muy agresivo, se ríe sin razón, molesta y chisteo. Habla rápidamente, el pensamiento es confuso. No tiene apetito y siempre está cansado. Tiembla y tiene la boca seca.	Tiene botellas y frascos de píldoras de diferentes colores y tamaños. Pastillas blancas en forma de corazón o capsulas. La droga no tiene olor, pero tiene sabor amargo. Fuma demasiado.	Puede morir de una sobredosis o puede volverse loco temporalmente. Las visiones le ocasionan problemas.
Depresivos, Barbitúricos, Doriden, Seconal, Tuinal y Nembutal. Conocidos por "goof balls".	Esta somnoliento y aturdimiento. Es lento. El hablar casi no se le entiende. Vomita y aparece estar embriagado.	Busque por píldoras de diferentes colores y tamaños. Botellas y frascos de diferentes tamaños.	Puede morir de una sobredosis. Puede causar adicción. Ocurren convulsiones y muerte si se deja el uso sin tratamiento. Afecta al cerebro.

SEÑALES COMUNES DEL ABUSO DE TODAS LAS DROGAS

CUANDO:

1. La persona visita lugares y casas donde ocurren actividades sospechosas, especialmente edificios vacíos, sótanos y techos.
2. La ropa, prendas y dinero desaparece de la casa.
3. La persona visita los lugares en que los adictos se reúnen.
4. La persona pasa mucho tiempo encerrado en el baño, cuarto o closet innecesariamente.
5. La persona no puede mantener un trabajo o mantenerse en la escuela.
6. La persona ya no quiere estar con viejos amigos y tiene nuevas amistades "raras y sospechosas."
7. La persona usa el vocabulario de los adictos a drogas. (i.e. arrebatarse, pichón, la estofa, etc.)
8. La persona usa camisas de mangas largas para tapar los "puyazos" en los brazos.

Cuando esto sucede es muy posible que su hijo, hija, familiar o amigo este usando las drogas. Por favor, ayúdalo, y trate de que la deje. Si no puede dejarla por sí solo, la persona debe visitar un programa de rehabilitación a adictos, tal como "CASA LIBERTAD II" y otros.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE
Sección de Trabajo Social